

i say: • FEEL RELIEVED

DANSK

i say: OPPUSTET & IBS SYMPTOM



Læs indlægssedlen grundigt, inden du bruger produktet. Gem indlægssedlen til fremtidig brug. Kontakt din læge eller dit apotek, hvis du har spørgsmål.

HVAD ANVENDES KAPSLERNE TIL?

- Behandler luftrelaterede symptomer ifm. Irritabel Tyktarm (IBS) såsom ubezag eller smørter forårsaget af tryk og oppustethed.
- Lindrer hurtigt smørter forårsaget af oppustethed. Kapslerne giver hurtig lindring ved at fusionere små luftbobler i mavetarmkanalen til større luftbobler, som bevirker at indespærret luft kan forlade kroppen nemmere og mere naturligt.



HVAD DU SKAL VIDE FÖR DU ANVENDER i say: OPPUSTET & IBS SYMPTOM

Tag ikke produktet hvis:

- Du er allergisk overfor ingredienserne.
- Du er i medicinsk behandling for en stofskiftesygdom med f.eks. Levothyroxine.
- Emballagen er beskadiget.

Konsulter egen læge, hvis:

- Symptomerne ikke forsvinder efter 5 dage eller forværres.
- Hvis der opstår ubezag som kvalme eller forstoppelse efter anvendelse af kapslerne.

HVEM KAN ANVENDE KAPSLERNE?

- Kapslerne kan bruges af voksne og børn fra 6 år (under opsyn). Kan anvendes af vegetarer og veganere.
- Simeticon virker kun i tarmen og kan bruges af diabetikere, gravide og ammende, som dog anbefales at konsultere egen læge inden brug.

HVORDAN ANVENDES i say: OPPUSTET & IBS SYMPTOM?

Dosering:

Tag kapslerne med et glas vand under/efter et måltid eller før sengetid. Overskrid ikke den anbefalede maksimale daglige dosis.

Alder	Dosis	Maksimal dosis pr. dag
Børn 6 til 14 år	1 kapsel	3 kapsler
Voksne og børn over 14 år	2-3 kapsler	9 kapsler

Vi anbefaler, at du efter 30 dages kontinuerlig brug af kapslerne holder pause i brugen af kapslerne for at kontrollere, om dine symptomer vedvarer. Hvis du er usikker på årsagen til dine symptomer, skal du kontakte din læge.

Hvis du tager flere kapsler end anbefalet:

- Konsulter din læge eller apoteket.
- Hvis du glemmer at tage en dosis, så tag en eller flere kapsler efter dit næste måltid. Du skal ikke tage dobbelt dosis.

HVAD ER INGREDIENSERNE?

125mg Simeticon, Pebermynteolie. Vegetabilsk soft-gel kapsel: Carrageenan, majsstivelse, glycerin, vand.

HVORDAN SKAL KAPSLERNE OPBEVARES?



- Kapslerne bør opbevares i den originale pakning. Opbevares ved stuetemperatur (15-25°C).
- Anvend ikke kapslerne efter udløbsdatoen, som står på blistertkortet og på pakningen.
- Opbevares utilgængeligt for børn.

HVAD INDEHOLDER PAKNINGEN?

- 30 kapsler
- Indlægsseddel

FAKTA OM OPPUSTETHED

At være oppustet defineres som enhver unormal hævelse i maveområdet forårsaget af indesluttet luft. Nogle fødevarer er kendt for at forårsage oppustethed, det gælder bl.a. bønner, broccoli, blomkål, kål, rosenkål, løg og hvidløg. De personer, der har en højere risiko for at blive oppustet er oftest dem, der følger en vegetarisk diæt, har usunde spisevaner (spiser for hurtigt, indtager madvarer med højt fedtindhold eller som ikke spiser nok fiberrige fødevarer); har Irritabel Tyktarm (IBS) eller uspecifik diarré.

TIPS FRA i say:

- Spis langsomt og tyg maden godt, brug tid på at nyde måltiden og spis ikke for meget.
- Sørg for at få masser af hvile og motion.
- Gå en tur efter måltiden, det fremmer fordøjelsen.
- Hvis du lider af stress, så prøv at berolige dig selv med vejtrækningsteknikker og afspændingsøvelser.
- Husk, at en tom tarm kan forårsage luftdannelse, så prøv at spise regelmæssigt og undgå at springe måltider over.
- Få eventuelt hjælp fra en professionel til at afgøre hvilke fødevarer der medfører, at du danner mere luft. Ved at skære ned på disse fødevarer, kan luftgener minimieres.

Brugeren/eller patienten skal til producenten rapportere enhver alvorlig eller formodet alvorlig hændelse, der er opstået i forbindelse med anvendelsen af produktet.

SVENSKA

i say: UPPBLÄSTHET & IBS-SYMTOM



Läs indlægssedlen noggrant innan du använder produkten. Spara bipacksedlen eftersom du kan behöva läsa den igen. Kontakta din läkare eller apotekspersonal om du har några frågor.

VAD ANVÄNDS KAPSLARNA FÖR?

- Kapslarna används för att behandla uppblästhet, ubezag av gaser och besvär av gaser vid IBS.
- Hjälper till att lindra smärtan vid uppblästhet.
- Lindrar snabbt smärta orsakad av uppblästhet. Kapslarna ger snabb lindring genom att smälta ihop små gasbubblor som orsakar smärta och svullnad till större, vilket gör att gasen lättare kan passera genom din kropp.



HVAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU ANVÄNDER i say: UPPBLÄSTHET & IBS-SYMTOM

Använd inte:

- Om du är allergisk mot ingredienserna i kapslarna.
- Om du är i medicinsk behandling för en sköldkörteltillstånd med t.ex. Levotyroxin;
- Om förpackningen är skadad

Kontakta din läkare om:

- Symtomen förbättras inte inom 5 dagar efter behandling eller förvärras
- Du upplever något obehagliga effekter, såsom illamående eller förstoppling, efter att ha tagit kapslarna.

VEM KAN ANVÄNDA KAPSLARNA?

- Kapslarna kan användas av vuxna och barn från 6 år (under uppsikt). Kan användas av vegetarier och veganer.
- Simetikon fungerar bara lokalt i din tarm. Även om det anses säkert att ta, rådfråga din allmänläkare eller apotekspersonal före användning om du är diabetiker, gravid eller ammar.

HUR MAN TAR i say: UPPBLÄSTHET & IBS-SYMTOM?

Dosering:

Ta kapseln med ett glas vatten, under/efter en huvudmåltid. Överskrid inte den maximala dosen per dag.

Ålder	Dosering	Högst antal kapslar per dag
Barn 6-14 år	1 kapsel	3 kapslar
Vuxna och barn över 14 år	2-3 kapslar	9 kapslar

Vi rekommenderar att du efter 30 dagars kontinuerlig användning av kapslarna pausar användningen av kapslarna för att kontrollera om dina symtom kvarstår. Om du är osäker på orsaken till dina symtom, kontakta din läkare.

Om du tar fler kapslar än rekommenderat:

- Kontakta din läkare eller apotekspersonal.
- Om du glömmer att ta en dos: Ta en eller flera kapslar efter nästa huvudmåltid. Ta inte dubbeldos.

INNEHÅLL

125 mg Simetikon, Pepparmintsolja. Vegeterisk mjukgelkapsel: Karragenan, Majsstärkelse, Glycerin, vatten.

HUR KAPSLARNA SKA FÖRVARAS?



- Förvara blistret i originalförpackningen i rumstemperatur (15-25°C).



- Använd inte kapslarna efter utgångsdatumet som står på blistertillstånden och ytterkartongen.



- Förvaras utan syn- och räckhåll för barn.

FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL?

- 30 kapslar

- Bipacksedel

INFORMATION

Uppblästhet är en allmän onormal känsa av uppsväldhet eller en ökning av bukdiamentor orsakad av instängd luft. Uppblästhet är vanligt förekommande, och drabbas många människor. Vissa livsmedel är kända för att orsaka uppblästhet, vanliga sådana är bönor, broccoli, blomkål, vitkål, groddar, lök och vitlök. Personer som har högre risk att drabbas, är personer som äter vegetarianisk kost, personer som har ohälsosamma matvanor (äter för snabbt, äter för fetrik mat, äter inte tillräckligt med fiberrik kost), har IBS (irritable bowel syndrome) eller diaré av okänd orsak.

i say: TIPS OCH RÅD

- Ät långsamt och tugga väl, ta dig tid för att njuta av måltiden, ät inte för mycket.
- Se till att du får tillräckligt med vila och motion.
- För att underlätta matsmältningen ta en promenad efter måltiden.
- Om du lider av stress, försök att varva ner med hjälp av anslutnings teknik och avslappningsövningar.
- Tänk på att när tarmen är tom kan gas bildas, så försök att äta regelbundet och hoppa inte över måltider.
- Ta reda på, med hjälp av sjukvärdspersonal, vilka livsmedel som ger dig extra mycket gasbesvär. Genom att långsamt dra ned på dessa livsmedel, kanske obehagen av gas kan förhindras.

Användaren och/eller patienten ska rapportera till tillverkaren varje allvarliga tillbud eller misstänkt allvarliga tillbud som har inträffat i samband med användningen av produkten.



Producent • Tillverkare: Medical Brands Developments B.V., Piet Heinlaan 199, 1019 HC Amsterdam, Holland • Alrankomaatti • Nederländerna



Distributör i Danmark • Distributör i Sverige: Pharmaforce ApS, Tlf. +45 70272747 • Markkinointi Suomessa: Sabora Pharma Oy, PL 20, 03601 Kirkkila • Marknadsförare i Finland: Sabora Pharma Oy, PB 20, 03601 Högfors • Distributör/Distributör i Island: Alvogen ehf, Smaratorgi 3, 201 Kopavogur www.alvogen.is

i say: BE GOOD TO YOUR BODY

SUOMI

i say: TURVOTOS & IBS -OIREET



Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä. Säilytä nämä käyttöohjeet, koska saatat joutua lukemaan ne uudelleen. Jos sinulla on kysytävää, ota yhteyttä lääkäriisi tai apteekkiin.

MIIHIN KAPSELIT ON TARKOITETTU?

Simetikonikapseleita käytetään

- Turvotuksen hoitoon, ilmavalojen aiheuttamaan epämukavuuden tunteeeseen ja ärtynän suolen oireyhtymästä (IBS) johtuvaa lisääntyneeseen suolistokaasun muodostumiseen.
- Lievittämään turvotuksesta aiheutuvaa kipua.
- Kapselit tarjoavat nopeaa helpotusta sulauttamalla pienet, kipua ja turvotusta aiheuttavat kaasukuplat suuremmiksi, jolloin suolistokaasu pääsee kulkemaan kehosilmiön läpi helpommin.



MITÄ SINUN ON TIEDETTÄVÄ, ENNEN KUIN KÄYTÄT SIMETIKONI-KAPSELEITA

Älä käytä:

- Jos olet allerginen tai yliherkkä ainesosille
- Jos kilpirauhasen sairautta hoidetaan lääkkeillä, kuten levityroksinilla;
- Jos pakaus on vahingoittunut

Ota yhteys lääkäriin, jos:

- Turvotosoireet eivät parane 5 päivän kuluessa hoidosta tai pahenevat.
- Sinula esintyy epämieltyväviä vaikuttuksia, kuten pahoinvointia tai ummetusta, kapseleiden ottamisen jälkeen.

KUKA VOI KÄYTTÄÄ SIMETIKONI KAPSELEITA?

Tavallinen annostus:

Ota kapseli vesilasillisen kanssa aterian aikana tai sen jälkeen. Älä ylitä enimmäisannosta päivässä.

MITEN KÄYTÄT SIMETIKONI KAPSELEITA?

Tavallinen annostus:

Ota kapseli vesilasillisen kanssa aterian aikana tai sen jälkeen. Älä ylitä enimmäisannosta päivässä.

Ikä	Annostus	Enimmäisannostus per päivä
Lapset 6 - 14 vuotta	1 kapseli	3 kapselia
Aikuiset ja yli 14vuotiaat lapset	2-3 kapselia	9 kapselia

Suosittelemme keskeyttämään kapseliensä jatkuvan käytön 30 päivän jälkeen ja kontrolloimaan vieläkä oireet jatkuvat. Jos olet epävarma oireiden syystä, ota yhteys lääkäriin.

Jos otat enemmän kapseleita kuin sinun pitäisi:

- Ota yhteyttä lääkäriin tai apteekkiin.

Jos unohdat ottaa annoksen:

- Ota kapseli(t) seuraavan aterian jälkeen. Älä ota kaksinkertaista annosta.

AINESOSAT

125 mg simetikonia, piparminttuoljyä. Kasvisperäinen pehmeä geelikapseli: karrageeni, maissitarckkelys, glyserini, vesi

MITEN KAPSELIT SÄILYTETÄÄN?



- Säilytä läpipainopakkaus alkuperäisessä pakkaussa huoneenlämmössä (15-25 °C).
- Älä käytä kapseleita läpipainopakkaukseen ja ulkopakkaukseen merkityn viimeisen käyttöpäivämääärän jälkeen.
- Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

MITÄ PAKKAUS SISÄLTÄÄ?

- 30 kapselia

- Käyttöohjeen

TIETOA TURVOTUKSESTA

Turvotus voi olla mitä tahansa epänormaalista turpoamisen tunnetta tai vatsan seudun laajemista, jonka aiheuttaa liiallinen kaasun muodostuminen suolistoon. Turvotus on yleinen vaiva monilla ihmisiillä. Jotkut ruoka-aineet aiheuttavat turvotusta, typillisiä suolistokaasujen aiheuttajia ovat pavut, parsakaali, kukkakaali, kala, ruusukaali, siipulit ja valkosipuli. Turvotusta voivat myös aiheuttaa kasvisruokavalio, epäterveelliset ruokaluitotumukset (liian nopea syöminen, rasvainen ruoka tai jos ruokavallossa ei ole tarpeeksi kuitupitoisia ruokia), ärtynvän suolen oireyhtymä (IBS) ja epäspesifinen ripuli.

i SAY: VINKKEJÄ

- Syö hitaasti ja pureskele ruoka hyvin, ota aikaa jotta voit nauttia ateriasta.
- Lepää ja kuntoile tarpeeksi.
- Edistääksesi ruuansulatusta, mene kävellylle aterian jälkeen.
- Jos käräist stressistä, kokeile erilaisia hengitys- ja rentoutumistekniikoita.
- Muista, että tyhjä suoliisto voi aiheuttaa kaasun muodostumista, joten yrity syödä säännöllisesti, äläkä jätä aterioita väliin.
- Pyydä tarvittaessa ammatillaisen apua määritämään, mitkä ruoat aiheuttavat ilmavaivoja. Vähentämällä näitä elintarvikkeita, kaasunmuodostamista voidaan minimoida.

Kaikista tuotteiden käyttöön liittyvistä (vakavista) haittavaikutuksista tulee ilmoittaa tuotteen valmistajalle.

i say: BE GOOD TO YOUR BODY

Drs Pieterella A.M. Bouter

Revideret: December 2022

Senast revideret: December 2022

Seloste tarkistettu: joulukuu 2022



DANSK

MD • Medicinsk udstyr.

UDI • Unik produktidentifikation.

	Materiale	Forkortelse	Affaldshåndtering
Blisterkort	Komposit (PVC, ALU)	C/PVC 3	Plastik
Æske	Pap (ikke bølge-pap)	PAP21	Pap
Indlægsseddel	Papir	PAP22	Papir

Kapsler: Returner venligst ubrugte eller udløbne kapsler til apoteket

CE-mærke er et firecifret identifikationsnummer tilhørende det bemyndigede organ, der er involveret i vurdering af overensstemmelsesproceduren. CE-mærkningen er producentens erklæring om, at produktet opfylder kravene i det gældende EU regulativ.

SVENSKA

MD • Medicinteknisk produkt.

UDI • Unik enhetsidentifierare.

	Material	Förkortning	Återvinningsinstruktioner
Blisterkort	Sammansatt (PVC, ALU)	C/PVC 3	Plast samling
Ytterförpackning	Icke wellpapp	PAP21	Kartong-samling
Bipacksedel	Papper	PAP22	Pappers-insamling

Kapslar: Oanvända eller utgångna kapslar vänligen returnera till apoteket

CE-märkning är ett fyrsiffrigt identifieringsnummer för det anmälda organ som deltar i bedömningen av överensstämelse förfaranden. CE-märkningen är tillverkarens deklaration om att produkten uppfyller kraven i tillämpligt EU-reglering.

SUOMI

MD • Lääkinnällinen laite.

UDI • Yksilöllinen laitetunniste.

	Materiaali	Lyhenne	Kierrätysohjeet
Läpipainopakkaus	Komposiitti (PVC, ALU)	C/PVC 3	sekajäte
Ulkopakkaus	Pahvi (ei aaltopahvia)	PAP21	pahvin-keräys
Pakkausseloste	Paperi	PAP22	paperin-keräys

Kapselit: Käyttämättömät tai vanhentuneet kapselit palautetaan apteekkiin

CE-merkintä on vaatimustenmukaisuuden arviointiin osallistuvan ilmoitetun laitoksen numeroinen tunnistenumero. CE-merkintä on valmistajan vakuutus sitä, että tuote täyttää sovellettavan EU-direktiivin vaatimukset.



Producer • Valmistaja • Tillverkare: Medical Brands Developments B.V., Piet Heinkeade 199, 1019 HC Amsterdam, Holland • Alankomaat • Nederländerna



Distributör i Danmark • Distributör i Sverige: Pharmaforce ApS, Tlf. +45 70272747 • Markinoija Suomessa: Sabora Pharma Oy, PL 20, 03601 Kirkkila • Marknadsförare i Finland: Sabora Pharma Oy, PB 20, 03601 Högfors • Distributör/Distributör i Island: Alvogen ehf, Smaratorgi 3, 201 Kopavogur www.alvogen.is